Bouresla

Vass7R13s386-390

0Mtp150

John Sto 380

Collection Vassal-Montpellier





ANNEE 4993

Juntanianialantania

NOM Bouresla. EMPLACEMENT 7R130.386.390 .
Bd. 8.89 in

dantadantadantadantad

Raid	100											
Souche	Wbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 ¥	-	,			1	3-6	5.6 +6	7.6	16.8	20,8	23,8	13.9
3 9 4 8 5		25.3 25.4.+16	5 4 - 1	1	Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins		Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	$\frac{1}{2}$; - P - OV-ON RG-N r - for	Dim: bov-cy: Jus ox - he	l-fus : inc ·		: L - M- (C)

ыO		1994 wres l	à		EMPLACEMENT 7 R 13 & 386. 390							
Souche	1,11,		rrement mi/d6b		Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison Matur			Maturit
1 2	4	17.3 24.3	213×	1	2				16.8	22.8	298	13.9
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			26.3x		Crappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - (disc-s	Mil Sphel Gr-Rs- m - a	1 : 2 - P D. 1 ov-6 Rg (N) r - fe	im : 2 obov-cy Jus	6×8 yl-fus : inc	3)- cc	oloré

ANNEE: 1995

MCM Bouresla

luntunlardie

EMPLACEMENT 7 R13 4 386, 390 ,

				·			,				_	
ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	and the second second	raison mi/f			raison mi/v		Maturit é
1 2	6 5	13.3	23,3 *	0			+7			+4		11,9
4 5	11		27,3.	101	<pre>Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</pre>							
	Dle	27.3.	95(+10)	71	Saveur Pépins Port :	: s -	m - al	r - fo yrène	ox - he	erb	- 00	oloré
	u.										•	

MON Bouresla

PMPLACEMENT 7 R13 1 386. 390

	Nbre yeux		rrement mi/d6b		Ferti- Floraison lité début mi/f fin					raison mi/v		Maturité
1 2	и 3	18,3 M.3	15,31	1	0,7	6.6	106 +M	14.6	17.8	21.8	248	20,9
4	2		11.3 ×	0	Crappe Pour :		Mil	1 :		Compa	<u>cită</u> :	1, - 11 -C.
5	4	4.3	14.3 4	0	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
	D	le M.	3,36		Pôpins	: s - : ave	m - a	r - f yrène	ox - h	erb	- C(oloré
					Fort :			<u>v</u>	igueur	. * 1.		

Mas do ~ °

alantanlantanlantanlantanl

MOM Bouresla in EMPLACIMENT 4 R 13 1386.390

Bd. 8.89.

Juntumbantia

	Rd.	8.83.		A colonia management colonia (A)						
iche	Nbre yeux	Débourrager début mi/de		Forti-		ratson mi/E				 trat in 316
1 , ,	2 3 · 2 11 TL — 18		0 2 1 2 5	Coulon Saveur	Tree or discovery to the second secon	Mil. ; - !! ph-ell i-Rs- m - a	l: - P -ov-ol Rd-N r - fo	Dim: hov-cyl	Compa L-fus the	: h :: c

	到
MUMIL: 1998 1100 Bouresla mi	11MPLACEMENT 7 R.13 A 386_390 .
iche Nbre Débourrement yeux début mi/déb	Obre Ferti Ploraison Véraison Maturité grap lité début mi/f fin début mi/v fin
2 2 2 3 4 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	9 3 4.5.5 28.5 2.6 04.08 16.8 14.8 691.9 decappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C. Pour: Mill: Baie: TG - S - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: N-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pópins: avec - apyrène Fort: Vigueur: S

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Bouresla

7R13 1-386-3904.5

dantarlantarlantarlantarl

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 92

Nº d'ordre : Désignation : Bouresla 7R13 s. 386-390 s.2

duntaidaataalaataalaataal

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côte[]. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 2(8) - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 2(5) - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 264) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 267 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: colore 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Bouresla 7 R 130-386,39021

dentriduatio lyatadantial

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142)- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 1/45) - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273. limbe : glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 2/15

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 1/64/partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168/entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/1/- court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 93

N° d'ordre : Bouresla

Désignation : 7R 13 1,386-390 A·1

Emplacement :

GRAPPE

dantadaa taabaataa laataa l

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 25 x 23). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97/- ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 ton déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 / court 121. A pédicelle de couleur : verte 1/22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129/ A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34) A peau fine 135 - moyenne $1\beta6$) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

-Calvo 93

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntaniumb

Bouresla 7R 13s. 386-390s.5

dantahan bahalan bahal

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (27).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6))violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 9?

M° d'ordre : Désignation : Bouresla Emplacement : 7 R 13 A 386, 390

```
: (1) - 2 - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
Sexe
                                   : (7)-(8)-9
L1/L
                                   : 10 - 11 .
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                    : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49 - 50
                                   : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60) - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63) - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

danindaatadaatadaalaalaadad

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94